

**Квалификационные тесты  
по специальности «Лечебное дело»  
Банк тестовых заданий для подготовки к аттестации  
Выбрать один или несколько правильных ответов**

**1. Лист нетрудоспособности единовременно выдается пациенту на срок:**

- 1) 3 дня
- 2) 6 дней
- 3) 15 дней
- 4) 10 дней \*
- 5) 30 дней

**2. Временная нетрудоспособность оформляется при:**

- 1) наложении карантина \*
- 2) родах \*
- 3) профилактических осмотрах
- 4) болезни \*
- 5) диспансерных осмотрах \*
- 6) протезировании конечности

**3. Проявления вестибулярных расстройств у пожилых:**

- 1) плохая разборчивость речи
- 2) тошнота \*
- 3) нарушение равновесия \*
- 4) ухудшение восприятия звуков
- 5) головокружение \*

**4. Основные симптомы сенильной деменции:**

- 1) нарушение ориентации \*
- 2) бред \*
- 3) нарушение речи
- 4) нарушение восприятия \*
- 5) нарушение памяти \*

**5. Основные симптомы глаукомы:**

- 1) потеря бинокулярного зрения
- 2) сужение полей зрения \*
- 3) помутнение хрусталика
- 4) повышение офтальмотонуса \*
- 5) повышение внутриглазного давления \*
- 6) сильные головные боли \*

**6. Основные симптомы катаракты:**

- 1) повышение офтальмотонуса
- 2) потеря бинокулярного зрения \*
- 3) помутнение хрусталика \*
- 4) афакия \*
- 5) слепота \*
- 6) сужение полей зрения

**7. Клинические симптомы тугоухости:**

- 1) ухудшение восприятия звуков \*
- 2) способность различать интенсивный звук
- 3) плохая разборчивость речи \*
- 4) улучшение восприятия звуков
- 5) шум в ушах \*

### **8. Основные симптомы кардиогенного шока:**

- 1) резкое повышение артериального давления
- 2) экспираторное удушье
- 3) жгучие боли за грудиной \*
- 4) нитевидный, слабого наполнения пульс \*
- 5) резкая бедность кожных покровов, холодный пот \*
- 6) резкое падение артериального давления \*

### **9. Основные признаки врожденного вывиха бедра:**

- 1) гиперемия кожных покровов над суставом
- 2) изменение длины конечности \*
- 3) отек в области сустава
- 4) развитие "утиной" походки \*
- 5) искривление голени
- 6) ассиметрия кожных складок бедра \*

### **10. Основные симптомы ревматизма:**

- 1) поражение крупных суставов \*
- 2) поражение мелких суставов
- 3) поражение сердца \*
- 4) формирование деформации суставов
- 5) "летучесть", симметричность поражения суставов \*
- 6) отсутствие деформации суставов \*

### **11. Основные симптомы острого пиелонефрита:**

- 1) пиурия, дизурия \*
- 2) гематурия, протеинурия
- 3) отеки, гипертензия
- 4) положительный симптом Пастернацкого \*

### **12. Характерные признаки легочного кровотечения:**

- 1) ярко-красный цвет крови \*
- 2) несвертываемая пенная кровь \*
- 3) темная кровь в виде сгустков
- 4) наличие примесей пищи

### **13. Причины кровотечения в первые три месяца беременности:**

- 1) варикозное расширение вен влагалища
- 2) предлежание плаценты
- 3) угрожающий и начавшийся выкидыш \*
- 4) прервавшаяся внематочная беременность \*

### **14. Симптом почечной колики характерен для:**

- 1) опухоли почки
- 2) мочекаменной болезни \*
- 3) острого пиелонефрита
- 4) острого цистита

### **15. Характерные симптомы почечной колики:**

- 1) дизурия \*
- 2) кетонурия
- 3) выраженные боли в правом подреберье
- 4) выраженные боли в поясничной области и по ходу мочеточника \*
- 5) пиурия

### **16. Характерные симптомы острого аппендицита:**

- 1) разлитая болезненность в правом подреберье

- 2) локальная болезненность в правой подвздошной области \*
- 3) местное напряжение брюшной стенки в правой подвздошной области \*
- 4) рвота "кофейной гущей"

**17. Клинические симптомы прободной язвы желудка:**

- 1) острая "кинжальная" боль в эпигастральной области \*
- 2) резкое напряжение брюшной стенки \*
- 3) многократная рвота \*
- 4) пенистая розовая мокрота

**18. Продолжительность боли при стенокардии составляет:**

- 1) несколько секунд \*
- 2) до 30 минут \*
- 3) до 1 часа
- 4) несколько дней

**19. Ведущие признаки бронхиальной астмы:**

- 1) приступы одышки с удлиненным вдохом
- 2) кашель с розовой мокротой
- 3) вынужденное положение во время приступа \*
- 4) приступы одышки с удлиненным выдохом \*
- 5) "бочкообразная" грудная клетка \*

**20. Характерные особенности инсулинонезависимого сахарного диабета:**

- 1) постепенное начало, чаще после 40 лет \*
- 2) склонность к ожирению \*
- \*3) возможность лечения таблетированными сахароснижающими препаратами \*
- 4) острое начало, чаще в детском и юношеском возрасте
- 5) склонность к развитию гипергликемических ком

**21. Ведущие симптомы желудочного кровотечения:**

- 1) боль в эпигастральной области, изжога, запоры \*
- 2) рвота цвета "кофейной гущи", дегтеобразный стул \*
- 3) головокружение, слабость, снижение артериального давления \*
- 4) боли в подвздошной области слева, стул с незначительными прожилками крови

**22. Характеристика болей при гиперацидном гастрите:**

- 1) боли в эпигастральной области после еды, изжога \*
- 2) боли в эпигастральной области, рвота "кофейной гущей"
- 3) опоясывающие боли в животе, понос
- 4) боли в эпигастральной области, анорексия

**23. Характеристика болей при гастрите с пониженной секреторной активностью:**

- 1) боли в левой подвздошной области, понос
- 2) боли в правом подреберье, горечь во рту
- 3) боли в эпигастрии, отрыжка "тухлым"
- 4) тяжесть в эпигастральной области после еды, вздутие живота \*

**24. Основные симптомы гипергликемической комы:**

- 1) потеря аппетита, жажда, запах "ацетона" изо рта \*
- 2) гипотония мышц, размягчение глазных яблок \*
- 3) гипертония мышц, судороги
- 4) потливость, тремор, головокружение, чувство голода
- 5) сонливость, потеря сознания \*

**25. Ведущие симптомы очаговой пневмонии:**

- 1) навязчивый кашель, приступы экспираторного удушья

- 2) кашель с обильной гнойной мокротой "полным ртом", лихорадка
- 3) кашель со слизисто-гнойной мокротой, боли в грудной клетке \*
- 4) боли в левой половине грудной клетки с иррадиацией в левое плечо

**26. Основные пути передачи инфекции при туберкулезе:**

- 1) воздушно-капельный \*
- 2) пищевой \*
- 3) контактно-бытовой \*
- 4) половой
- 5) внутриутробный \*

**27. Возможные осложнения гипертонической болезни:**

- 1) инфаркт миокарда
- 2) миокардит '
- 3) отек легких \*
- 4) инсульт \*

**28. Схема медикаментозного лечения очаговой пневмонии:**

- 1) антибактериальные препараты \*
- 2) гипотензивные средства
- 3) отхаркивающие средства \*
- 4) бронхо, муколитики \*
- 5) адrenomоляторы

**29. Факторы риска рака желудка:**

- 1) анацидный гастрит \*
- 2) полипы желудка \*
- 3) холецистит
- 4) панкреатит
- 5) гиперацидный гастрит \*



**30. Продолжительность продромального (безжелтушного) периода при вирусном гепатите В составляет:**

- 1) 3-5 дней
- 2) 15-30 дней
- 3) 60-120 дней \*

**31. Характерные симптомы ветряной оспы:**

- 1) везикуло-папулезная сыпь, в разной стадии развития
- 2) увеличение затылочных лимфоузлов, крупноточечная сыпь \*
- 3) конъюнктивит, крупнопятнистая сыпь, с последующим шелушением
- 4) повторная рвота, геморрагическая сыпь

**32. Характерные симптомы локализованной формы дифтерии зева:**

- 1) на миндалинах налет серо-белого цвета в виде островков или плотных пленок \*
- 2) гиперемия, увеличенные миндалины с желтоватым налетом
- 3) образование эрозивных поверхностей на миндалинах при попытках удаления налета \*
- 4) отечность, гиперемия задней стенки глотки

**33. Основные симптомы скарлатины:**

- 1) ангина, мелкоточечная яркая сыпь на гиперемизованном фоне \*
- 2) увеличение затылочных лимфоузлов, крупноточечная сыпь
- 3) конъюнктивит, крупнопятнистая сыпь, с последующим шелушением
- 4) повторная рвота, геморрагическая сыпь

**34.Основной путь передачи менингококковой инфекции:**

- 1)воздушно-капельный \*
- 2)алиментарный
- 3)трансмиссивный
- 4)водный

**35.Признаки ботулизма:**

- 1)геморрагическая сыпь
- 2)расстройство глотания \*
- 3)расстройство зрения \*
- 4)рвота, частый жидкий стул \*
- 5)расстройство дыхания \*
- 6)запоры и вздутие живота

**36.К физиологическим потребностям, согласно иерархии по Маслоу, относятся:**

- 1)дышать \*
- 2)адекватно есть, пить \*
- 3)определять отеки
- 4)измерять артериальное давление
- 5)поддерживать нормальную температуру тела \*

**37.Основные симптомы острого гломерулонефрита:**

- 1)положительный симптом Кернига
- 2)лейкоцитурия, бактериурия
- 3)положительный симптом Пастернацкого \*
- 4)гематурия, протеинурия, цилиндрурия \*
- 5)отеки, гипертензия \*

**38.Для лечения пневмонии используют**

- 1)антибиотики, сульфаниламиды, ЛФК, массаж \*
- 2)аэрозоли с новодрином, астмопентом
- 3)увлажненный кислород, витамины группы В и С \*

**39.Осложнения острых пневмоний могут быть**

- 1)отит, плеврит \*
- 2)перикардит,менингит \*
- 3)стафилококковая деструкция легких \*

**40.Повышенное содержание гемоглобина и эритроцитов в анализе крови наблюдается при пороках**

- 1)синего типа \*
- 2)белого типа
- 3)с препятствием выбросу крови из желудочков

**41.Признаки,характерные для ревматизма**

- 1)кашель,заложенность носа
- 2)боли в суставах \*
- 3)поражение сердца \*
- 4)повышение температуры тела \*

**42.При ревматизме происходит поражение суставов**

- 1)коленных \*
- 2)локтевых \*
- 3)голеностопных \*
- 4)лучезапястных \*

**43. Сыпь при болезни Шенлейн-Геноха (капилляротоксикоз)**

- 1)пятнисто-папулезная, симметричная \*
- 2)крупнопятнистая, несимметричная
- 3)гемморагическая, симметричная

**44.Средством,укрепляющим сосудистую стенку является**

- 1)викасол
- 2)глюконат кальция \*
- 3)димедрол

**45.Основные причины и симптомы молочницы**

- 1)возникновение белых крошек на гиперемированной слизистой оболочке губ,щек,языке,деснах \*
- 2)приобретение патогенных свойств дрожжеподобными грибками \*
- 3)нарушение гигиенического режима. \*

**46.Острый гастрит- это**

- 1)дистрофические изменения в слизистой оболочек желудка
- 2)воспаление слизистой оболочки желудка \*
- 3)воспаление слизистой оболочки желудка и тонкого кишечника

**47.Общими симптомами при глистных инвазиях могут быть**

- 1)схваткообразные боли в животе, тошнота, плохой аппетит, утомляемость \*
- 2)раздражительность, потеря сознания, судороги \*
- 3)на коже может быть крапивница, в крови анемия, эозинофилия. \*

**48.Энтеробиоз- это заражение**

- 1)острицами \*
- 2)аскаридами
- 3)власоглавом

**49.Заражение при пиелонефрите происходит путем**

- 1)гематогенным \*
- 2)восходящим \*
- 3)лимфогенным \*

**50.Для гематурической формы гломерулонефрита наиболее характерны**

- 1) макрогематурия \*
- 2)лейкоцитурия
- 3)отеки, гипертензия