

**Квалификационные тесты
по специальности «Операционное дело»
Банк тестовых заданий для подготовки к аттестации
Выбрать один или несколько правильных ответов**

- 1. Вид повязки при венозном кровотечении**
 1. давящая
 2. окклюзионная
 3. спиральная
 4. лейкопластырная
- 2. повязка применяется при ранении кисти**
 1. крестообразная
 2. "перчатка"
 3. черепашья
 4. ползучая
- 3. При переломе нижней челюсти необходима повязка**
 1. возвращающаяся
 2. пращевидная
 3. 8-образная
 4. крестообразная
- 4. Повязка, применяемая при носовом кровотечении**
 1. лейкопластырная
 2. пращевидная
 3. "уздечка"
 4. циркулярная
- 5. При травме коленного сустава накладывают повязку**
 1. черепашью
 2. змеевидную
 3. спиральную
 4. колосовидную
- 6. После вскрытия карбункула на задней поверхности шеи используют повязку**
 1. "чепец"
 2. крестообразную
 3. "уздечку"
 4. возвращающуюся
- 7. Повязку Дезо используют при переломе**
 1. костей предплечья
 2. грудины
 3. ключицы
 4. ребер
- 8. При ожоге кисти накладывают повязку**
 1. сходящуюся
 2. клеевую
 3. "варежка"
 4. "перчатка"
- 9. К твёрдым повязкам относится**
 1. бинтовая
 2. гипсовая
 3. клеевая
 4. давящая
- 10. При вывихе плеча применяют повязку**

1. косыночную
2. спиральную
3. 8-образную
4. круговую

11. При открытых переломах накладывают гипсовую повязку

1. мостовидную
2. окончатую
3. створчатую
4. лонгетную

12. После вправления вывиха плеча накладывают гипсовую повязку

1. Дезо
2. колосовидную
3. крестообразную
4. Вельпо

Группы инструментов применяемые во время оперативного вмешательства

13. Инструмент, разъединяющий ткани

1. бельевые зажимы
2. корнцанг
3. зажим Кохера
4. скальпель

14. Инструмент для защиты тканей от случайного повреждения

1. ножницы остроконечные
2. зонд Кохера
3. иглы круглые
4. пинцет хирургический

15. Корцанг применяют для

1. наложения швов
2. остановки кровотечения
3. подачи перевязочного материала
4. фиксации операционного белья

16. Инструмент для остановки кровотечения

1. зажимы Пеана и Кохера
2. зубчато-лапчатый пинцет
3. цапки
4. зажим Микулича

17. Иглы Дешана применяют

1. укрепления белья вокруг операционной раны
2. ушивания раны
3. проведения лигатуры под сосуд
4. наложения швов на сосуд

18. В набор для ПХО раны мягких тканей входит

1. проволочная пила Джигли
2. роторасширитель
3. лопатка Ревердена
4. пинцет хирургический

19. Инструмент расширяющий раны

1. ножницы остроконечные
2. роторасширитель
3. крючки Фарабефа

4. костные кусачки Люэра
- 20 Инструмент из набора для проведения трахеостомии**
 1. языкодержатель
 2. пила дуговая
 3. трахеорасширитель
 4. окончатый зажим
- 21 Абсолютный признак перелома костей**
 1. деформация сустава
 2. деформация мягких тканей
 3. отек
 4. патологическая подвижность костных отломков
- 22 Признак, характерный только для перелома**
 1. кровоподтек
 2. припухлость
 3. крепитация костных отломков
 4. нарушение функции конечности
- 23 Симптом, характерный только для вывиха**
 1. боль
 2. гиперемия
 3. нарушение функции
 4. пружинящая фиксация
- 24 Патологическим называется вывих**
 1. врожденный
 2. при травме
 3. при разрушении кости
 4. "застарелый"
- 25 Множественный перелом- это**
 1. перелом плеча и бедра
 2. перелом бедра
 3. перелом голени
 4. перелом нижней челюсти
- 26 Комбинированная травма - это**
 1. сочетание двух и более повреждающих факторов
 2. повреждение одного сегмента конечности
 3. перелом бедра и голени
 4. разрыв мочевого пузыря и перелом, костей таза
- 27 Абсолютное укорочение конечности характерно для**
 1. растяжения связок
 2. перелома костей
 3. ушиба
 4. разрыва суставной капсулы
- 28 Тепловые процедуры при ушибе мягких тканей назначают**
 1. на 2-3 сутки
 2. сразу после травмы
 3. через несколько часов
 4. не назначают вообще
- 29 Сочетанная травма - это**
 1. перелом плечевой кости и ЧМТ
 2. проникающее ранение брюшной полости
 3. перелом бедра и голени
 4. разрыв селезенки
- 30 Отличительный признак ожога II степени**

1. гиперемия
2. боль
3. наличие пузырей или их остатков
4. отек тканей

31 Степень отморожения можно определить

1. сразу после согревания
2. на 2-й день
3. в дореактивном периоде
4. спустя несколько дней

32 Характерный признак отморожения

1. некроз всей толщи кожи
2. образование пузырей
3. обратимая сосудистая реакция
4. мраморность кожи

33 Основной признак перелома рёбер

1. локальная крепитация
2. точечные кровоизлияния на коже туловища
3. кровоподтек
4. боль

34 Профилактику столбняка необходимо провести при

1. ушибе мягких тканей кисти
2. закрытом переломе плеча
3. колотой ране стопы
4. растяжении лучезапястного сустава

35 Признак закрытого пневмоторакса

1. усиление дыхательных шумов
2. укорочение перкуторного звука
3. брадикардия
4. коробочный звук при перкуссии

36 Открытый пневмоторакс- это

1. скопление воздуха в подкожной клетчатке
2. воздух, попавший при ранении в плевральную полость
3. перемещение воздуха при дыхании через рану грудной клетки в плевральную полость и обратно, рана "дышит"
4. скопление крови в плевральной полости

37 Причина ожогового шока

1. спазм сосудов кожи
2. психическая травма
3. боль и плазмопотеря
4. кровотечение

38 Симптом клапанного пневмоторакса

1. нарастающая одышка
2. урежение пульса
3. усиление дыхательных шумов
4. отечность тканей

39 Признаки гемоторакса

1. одышка, на стороне поражения дыхание не прослушивается, перкуторно коробочный звук
2. притупление перкуторного звука, дыхание при аускультации ослаблено, прогрессирующее падение АД
3. крепитация при надавливании на кожу грудной клетки, затрудненное дыхание
4. шум трения плевры, боль при дыхании

40 Причина травматического шока

1. нарушение дыхания
2. интоксикация
3. болевой фактор
4. психическая травма

41 Раны называются сквозными, если

1. имеется поверхностное повреждение мягких тканей, в виде желоба
2. имеется только входное отверстие
3. имеются входное и выходное отверстия
4. повреждена кожа

42 Рана является проникающей, если

1. в ней находится инородное тело
2. повреждены только кожа и подкожная клетчатка
3. повреждены мышцы и кости
4. повреждены мягкие ткани и пограничная серозная оболочка (плевра, брюшина)

43 Укушенные раны опасны

1. заражением бешенством
2. заражением туберкулезом
3. большой кровопотерей
4. переломом костей

44 Первичная хирургическая обработка раны- это

1. иссечение краев, дна и стенок раны
2. промывание раны
3. удаление из раны сгустков крови и инородных тел
4. наложение на рану вторичных швов

45. Абсолютный симптом раны

1. крепитация
2. зияние краев
3. флюктуация
4. патологическая подвижность

46 Колотые раны наиболее опасны тем, что возможно повреждение

1. нервов
2. костей
3. внутренних органов
4. сосудов

47 Характеристика резаной раны

1. края ровные, зияет
2. большая глубина, точечное входное отверстие
3. края неровные, вокруг кровоизлияние
4. края неровные, зияет

48 Условия для заживления раны первичным натяжением

1. края ровные, хорошо соприкасаются
2. края неровные, между ними значительный промежуток
3. нагноение раны
4. инородное тело в ране

49 Наиболее опасный симптом ранения

1. кровотечение
2. инфицирование
3. дефект кожи
4. нарушение функции поврежденной части тела

50 Вид ран, где чаще всего возможно повреждение костей

1. лоскутная
2. рубленая

3. колотая

4. резаная

Ответы к тестам:

№	ответ	№	ответ
1	1	31	4
2	2	32	2
3	2	33	1
4	2	34	3
5	1	35	4
6	2	36	3
7	3	37	3
8	3	38	1
9	2	39	2
10	1	40	3
11	2	41	3
12	1	42	4
13	4	43	1
14	2	44	1
15	3	45	2
16	1	46	3
17	3	47	1
18	4	48	1
19	3	49	1
20	3	50	2
21	4		
22	3		
23	4		
24	3		
25	2		
26	1		
27	2		
28	1		
29	1		
30	3		