

Квалификационные тесты  
по специальности «Сестринское дело в педиатрии»  
Банк тестовых заданий для подготовки к аттестации  
Выберите правильный ответ

**1. На грудном вскармливании частоту и продолжительность сосания:**

1. устанавливает сам ребенок
2. рекомендует врач
3. устанавливает кормящая мать
4. рекомендует медсестра

**2. Частота кормлений новорожденного ребенка в течение суток не менее:**

1. 4-5 раз
2. 6-7 раз
3. 8-9 раз
4. 8-12 раз

**3. Грудное молоко полностью обеспечивает ребенка всеми питательными веществами не менее чем до:**

1. 1-2 мес.
2. 3-4 мес.
3. 5-6 мес.
4. 7-8 мес.

**4. При недостаточном поступлении пищевых веществ у грудного ребенка отмечается:**

1. малая прибавка в весе
2. частое мочеиспускание
3. обильный стул

**5. Показания для введения докорма ребенку на грудном вскармливании:**

1. гипогалактия
2. паратрофия
3. срыгивание
4. дисфагия

**6. Окружность головы измеряют у всех детей в возрасте до:**

1. 1 года
2. 2 лет
3. 3 лет
4. 5 лет

**7. Окружность головы совпадает с окружностью груди у детей в возрасте:**

1. к 6 мес.
2. от 1 до 2 лет
3. от 2-3 лет
4. от 3 до 5 лет

**8. Рост у детей до 2 лет измеряют в положении:**

1. лежа на спине
2. лежа на боку
3. стоя

**9. У детей пульс считают на протяжении:**

1. 15 сек.
2. 30 сек.
3. полной минуты

**10. Частота пульса у ребенка 5 лет составляет в 1 минуту в среднем:**

1. 140

2. 120

3. 100

**11. Для профилактики опрелости складки кожи новорожденного обрабатывают:**

1. стерильным растительным маслом
2. фурациллином
3. зеленкой
4. физраствором

**12. Для очищения носовых ходов новорожденного используют:**

1. сухие ватные жгутики
2. ватные жгутики, смоченные стерильным маслом
3. марлевые жгутики

**13. Для очищения наружных слуховых проходов у детей раннего возраста используют:**

1. сухие ватные жгутики
2. ватные жгутики, смоченные стерильным маслом
3. марлевые жгутики

**14. При проведении очистительной клизмы положение ребенка с несколько прижатыми к животу ногами на:**

1. левом боку
2. правом боку
3. спине

**15. При уходе за новорожденным используют белье:**

1. стерильное
2. чистое продезинфицированное
3. любое

**16. Профилактика гонобленорей производится:**

1. фурациллином
2. сульфацилом натрия 20%
3. сульфацилом натрия 30%

**17. Поверхность среза пуповины после наложения скобы обрабатывается:**

1. перманганатом калия 5%
2. йодом 2%
3. спиртом этиловым 96%

**18. Первичная обработка кожных покровов производится:**

1. йодом 2%
2. перманганатом калия 5%
3. стерильным растительным маслом

**19. Доношенным считается ребенок, родившийся при сроке беременности:**

1. более 42 нед.
2. 38-42 нед.
3. 34-37 нед.
4. 29-33 нед.

**20. Родителей следует предупредить, что здорового ребенка нужно укладывать в положение:**

- 1 на спине
2. на боку

**21. Состояние здоровья детей оценивают по:**

1. уровню физического и психического развития
2. наличию хронических заболеваний
3. функциональному состоянию систем организма
4. все ответы правильные

**22. Выделяют следующее количество групп здоровья:**

1. две

2. три
3. четыре
4. пять

**23. Ко второй группе здоровья относятся дети:**

1. здоровые
2. с нарушением осанки
3. с бронхиальной астмой
4. с сахарным диабетом

**24. К третьей группе здоровья относятся дети с пиелонефритом в стадии:**

1. ремиссии
2. субкомпенсации
3. декомпенсации

**25. Заключение о школьной зрелости дает:**

1. педиатр
2. педагог
3. медико-педагогическая комиссия

**26. Купируя гипертермический синдром у детей, применяют холодные обертывания пеленками, смоченными водой температуры (в градусах):**

1. 4-5
2. 8-10
3. 12-14
4. 16-18

**27. Основной жаропонижающий препарат в детской практике, и применяющийся для борьбы с гипертермическим синдромом:**

1. анальгин
2. парацетамол
3. пипольфен
4. баралгин

**28. При гипертермическом синдроме температуру тела у ребенка контролируют каждые (минуты):**

1. 15-30
2. 30-60
3. 60-90
4. 90-120

**29. Для купирования судорожного синдрома у детей применяют:**

1. димедрол в/м
2. фенобарбитал в таблетках
3. седуксен в таблетках
4. седуксен, реланиум в/м или в/в

**30. Анафилактический шок у детей наиболее часто возникает после введения:**

1. антибиотиков
2. инсулина
3. препаратов железа
4. витамина В1

**31. Факторы, способствующие развитию пневмонии:**

1. рахит
2. анемия
3. врожденные пороки сердца, диатезы
4. все выше перечисленное

**32. Существующая проблема ребенка с острой пневмонией**

1. кашель, одышка

2. снижение аппетита
  3. все выше перечисленное
- 33. При дыхательной недостаточности второй степени наблюдается одышка:**
1. в покое
  2. при нагрузке
  3. с участием вспомогательной мускулатуры в покое
- 34. Мед. отвод от прививок после перенесенной острой пневмонии:**
1. 14 дней
  2. 1 месяц
  3. 2 месяца
  4. 1 год
- 35. Хроническое рецидивирующее заболевание бронхов, характеризующееся приступами удушья, называется:**
1. бронхиальной астмой
  2. бронхитом
  3. пневмонией
- 36. Симптомы, характерные для приступа бронхиальной астмы:**
1. затрудненный вдох, влажные хрипы
  2. затрудненный выдох, влажные хрипы
  3. затрудненный вдох, сухие хрипы
  4. затрудненный выдох, сухие хрипы
- 37. В основе приступа бронхиальной астмы лежит:**
1. воспалительный процесс в бронхах
  2. бронхоспазм
  3. воспалительный процесс в легких
- 38. Ревматизм может развиваться после следующих заболеваний:**
1. кори, коклюша
  2. скарлатины, ангины
  3. дифтерии
- 39. В остром периоде ревматизма режим:**
1. строгий постельный
  2. постельный
  3. полупостельный
  4. общий
- 40. Для профилактики рецидивов ревматизма медсестра рекомендует:**
1. соблюдение режима
  2. рациональное питание
  3. санацию очагов инфекции
  4. все ответы правильные
- 41. Длительность диспансерного наблюдения детей с муковисцидозом составляет:**
1. 1 год
  2. в течение всего периода детства
  3. 3 года
  4. 5 лет
  5. зависит от частоты обострений заболевания
- 42. Когда можно сделать прививку ребенку, выписанному из стационара с диагнозом «Обострение хронического гастрита»:**
1. через 2 месяца
  2. через 6 месяцев
  3. через 1 год
  4. постоянный медотвод

**43. Специфическую профилактику рахита недоношенным детям проводят с возраста:**

1. 10 дней
2. 1 месяца
3. 3 недель
4. с первых дней жизни

**44. Наиболее частая причина острых болей в животе у детей грудного возраста:**

1. острый аппендицит
2. инвагинация кишечника
3. острый панкреатит
4. острый холецистит

**45. Дети, страдающие бронхиальной астмой, снимаются с диспансерного учета при отсутствии приступов в течение:**

1. 2-3 лет
2. 5 лет
3. 7 лет
4. не снимаются с учета до передачи в подростковый кабинет

**46. В течение острых инфекционных заболеваний различают следующие периоды:**

1. инкубационный
2. продромальный, разгара
3. реконвалесценции
4. все ответы правильные

**47. Инкубационный период болезни называется период:**

1. с момента заражения до появления клинических симптомов
2. проявление основных симптомов заболевания
3. бессимптомное течение болезни

**48. Лабораторный метод, применяемый для диагностики любого вида инфекционных заболеваний:**

1. бактериологический
2. биологический
3. серологический

**49. Резервуар и источник инфекции при ветряной оспе:**

1. больной человек
2. вирусоноситель
3. насекомые
4. грызуны

**50. Механизм передачи ветряной оспы:**

1. аэрозольный
2. контактно-бытовой
3. фекально-оральный

Ответы к тестам Сестринское дело в педиатрии

№	ответ	№	ответ	№	ответ	№	ответ
1	1	16	2	31	4	46	4
2	4	17	1	32	3	47	1
3	3	18	3	33	1	48	1
4	1	19	2	34	2	49	1
5	1	20	2	35	1	50	1
6	1	21	4	36	4		
7	1	22	4	37	2		
8	1	23	2	38	2		
9	3	24	1	39	1		
10	3	25	3	40	4		
11	1	26	3	41	2		
12	2	27	2	42	1		
13	1	28	2	43	1		
14	1	29	4	44	2		
15	1	30	1	45	4		