

**Квалификационные тесты  
по специальности «Фармация»  
Банк тестовых заданий для подготовки к аттестации  
*Выбрать один или несколько правильных ответов***

- 1. К легковоспламеняющимся веществам относятся:**
  1. калия перманганат, сера, лекарственное растительное сырье
  2. скипидар, молочная кислота, коллодий
  3. растительные масла, глицерин, серебра нитрат
- 2. Для поддержания в сухих помещениях повышенной влажности рекомендуется ставить сосуд с:**
  1. 2 % раствором карболовой кислоты
  2. углекислым аммонием
  3. формалином
- 3. Резиновые изделия должны храниться в помещениях с относительной влажностью не менее**
  1. 65 %
  2. 55 %
  3. 75 %
- 4. Для функционирования аптека обязана иметь:**
  1. разрешение органов налоговой инспекции
  2. разрешение органов пожарного и санитарного надзора
  3. разрешение МЗ
  4. сертификат
  5. лицензию
  6. рекомендации органов здравоохранения
- 5. В форме унитарных предприятий могут быть созданы:**
  1. государственные предприятия
  2. акционерные общества
  3. муниципальные предприятия
- 6. Имущество унитарного предприятия:**
  1. может быть распределено по вкладчикам
  2. не может быть распределено по вкладчикам
- 7. Свободная розничная цена формируется за счет:**
  1. торговой надбавки к оптово-отпускной цене
  2. торговой надбавки к оптовой цене промышленности
- 8. Торговая деятельность аптечного киоска заключается:**

1. реализация лекарственных средств по рецептам врачей
2. в отпуске простейших лекарств без рецептов
3. в отпуске предметов санитарии, гигиены, ухода за больными

**9. Функции по изготовлению и реализации лекарственных средств в аптечном пункте должны выполнять:**

1. фармацевты со стажем работы не менее 5 лет
2. специалисты с высшим фармацевтическим образованием
3. фармацевты, имеющие профессиональный сертификат

**10. Аптечный пункт II категории может быть:**

1. с правом изготовления лекарственных форм
2. без права изготовления лекарственных форм

**Установите соответствие:**

**11. Между способом хранения и резиновыми изделиями:**

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 1. в лежащем положении    | 1. жгуты               |
| 2. в повешенном положении | 2. ирригаторная трубка |
|                           | 3. бужи                |
|                           | 4. катеторы            |
|                           | 5. пузыри для льда     |
|                           | 6. перчатки            |
|                           | 7. зонды               |

**12. Между режимом хранения и лекарственным средством:**

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. t от +4 °С до 12 °С | 1. эссенциале               |
| 2. t от 12 °С до 15 °С | 2. медицинские жирные масла |
|                        | 3. экстракт солодки         |
|                        | 4. суппозитории             |
|                        | 5. настойки                 |
|                        | 6. мази.                    |

**13. Между прописью рецепта и правилами выписывания:**

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Табл. кодтерпин     | 1. ф. бл. 107/у, подпись и печать<br>врача   |
| 2. Табл. фенобарбитала | 2. спец. бл. розового цвета подпись, печать<br>врача, подпись гл.врача, круглая печать ЛПУ |
|                        | 3. ф. бл. 107/у, подпись врача, гербовая печать<br>ЛПУ                                     |
|                        | 4. ф. бл. 148-1 /у-88, подпись, печать врача,<br>печать ЛПУ для рецептов                   |

**14. Между сроком хранения рецепта в аптеке и прописями рецепта:**

- |          |                         |
|----------|-------------------------|
| 1. 1 год | 1. табл. кодеина сахар. |
|----------|-------------------------|

2. 5 лет

2. табл. алнагон

3. табл. радедорм

4. р-р дикаина 0,25% 5 мл 5.табл. ноксирон

**15. Между прописями рецепта и сроком действия рецепта:**

1. табл. сонапакс

1. 10 дней

2. табл. фебранон

2. 2 месяца

3. н-ка заманихи

3. 5 дней

4. 1 месяц

5. 1 год

**16. Между нормами отпуска и лекарственными средствами:**

1. 0,6

1. промедол

2.1,0

2. эфедрина г/х

3. 10 - 12 табл.

3. табл. фенobarбитала

4. этаминал натрия пор.

5. омнопон

**17. Между этикетками на штангласы и правилами оформления:**

1. в ассистентской комнате

1. номер серии завода изготовителя

2. в помещениях хранения

2. дата заполнения

3. номер анализа склада

4. номер анализа аптеки

5. подпись заполнившего

6. подпись проверившего

7. срок годности

**18. Между формами рецептурного бланка и прописями рецепта:**

1. 107/у

1. н-ка заманихи 50 мл

2. специальный бланк розового цвета 2. р-р омнопона 1: - 1 мл

3. 148-1/у-88

3. табл. фенobarбитала 0,5 № 10

4. спирт этиловый 50,0

5. амп. клофелина

6. табл. промедола 0,025 №5

**19. Между лекарственным средством и токсикологической или фармакологической группой:**

1. ретаболил

1. наркотические средства

2. метилтестостерон

2. снотворные

3. барбитал натрия

3. стероидные гормоны

4. одурманивающего действия 5.анаболики 6. ядовитые

**20. Между нормами отпуска и лекарственными средствами:**

- |                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| 1. 0,2           | 1. табл. эфедрина г/х |
| 2. 10 - 12 табл. | 2. промедол           |
| 3. 20 табл.      | 3. табл. клофелина    |
|                  | 4. кодеин             |
|                  | 5. табл. барбитала    |
|                  | 6. табл. Алнагона     |

**Выберите правильный ответ:**

**21. Антацидные средства назначают:**

- а) за 30 мин. до еды
- б) во время еды
- в) через 1 -2 часа после еды

**22. Транквилизаторы бензодиазепинового ряда назначают:**

- а) не более 1 недели
- б) не более 2-х месяцев
- в) курс лечения не ограничен

**23. Нафтизин используют при:**

- а) острых ринитах
- б) хронических ринитах
- в) при любых ринитах

**24. Препараты нитроглицерина можно вводить в организм всеми указанными способами, кроме:**

- а) под язык
- б) таблетки внутрь
- в) суппозитории
- г) аэрозоли
- д) местно (мази, пластыри)

**25. Сильным мочегонным средством является:**

- а) дихлотиазид
- б) верошпирон
- в) фуросемид
- г) диакарб

**26. При температуре у ребенка 3-х лет назначают:**

- а) анальгин
- б) аспирин
- в) эффералган с вит.С
- г) калпол

**27. Какие антигистаминные препараты вызывают сильный седативный эффект:**

- а) фенкарол
- б) димедрол
- в) кларитин
- г) гисманал
- д) пипольфен (дипразин)

**28. Для лечения бронхиальной астмы используют:**

- а) пипольфен
- б) интал
- в) кетотифен
- г) димедрол
- д) кларитин

**29. К желчегонным средствам относят:**

- а) аллохол
- б) танацехол
- в) фестал
- г) имодиум
- д) холензим
- е) вентер

**30. К антибиотикам макролидам относят:**

- а) ампициллин
- б) эритромицин
- в) клацид
- г) оксациллин
- д) сумамед

**31. При заболевании желудочно-кишечного тракта применяют ферментные препараты:**

- а) аллохол
- б) фестал
- в) рамнил
- г) вентер
- д) панзинорм
- е) солизим

**32. Для лечения гипертонической болезни используют:**

- а) каптоприл
- б) аймалин
- в) дигитоксин
- г) корданум
- д) коринфар
- е) ренитек

**33. Глюкокортикоиды применяют:**

- а) как противовоспалительные средства при ревматизме, полиартритах
- б) как противоаллергические препараты
- в) для ускорения заживления ран
- г) для повышения концентрации сахара в крови
- д) для лечения язвенной болезни

**34. К комбинированным сульфаниламидным препаратам относят:**

- а) триампур

- б) бисептол
- в) кристепин
- г) септрин
- д) ампиокс

**35. Синонимы диазепама:**

- а) нозепам
- б) сибазон
- в) реланиум
- г) судексен
- д) рудотель

**36. К сердечным гликозидам относят:**

- а) целанид
- б) циметидин
- в) адонизид
- г) изоптин
- д) дигоксин
- е) корданум

**37. К сульфаниламидным препаратам длительного действия относятся:**

- а) стрептоцид
- б) фталазол
- в) сульфапиридазин
- г) сульфадимезин
- д) сульфадиметоксин

**38. К трехфазным пероральным контрацептивам относятся:**

- а) антеовин
- б) регивидон в) тризистон
- г) нон-овлон
- д) три-регол
- е) марвелон

**39. При назначении противомикробных средств (химиотерапевтических):**

- а) использовать ударные дозировки
- б) соблюдать курс лечения
- в) назначать препарат каждые четыре часа
- г) подбирать препарат с учетом возбудителя заболевания

**40. Ноотропные препараты назначают при:**

- а) эпилепсии
- б) инсульте
- в) психозах
- г) нарушении памяти
- д) умственном недоразвитии
- е) болезни Паркинсона
- ж) атеросклерозе головного мозга

Выберите правильный ответ:

**41. Основным вредным фактором в аптеке является:**

1. физический
2. химический
3. газообразные химические вещества

4. медикаментозная пыль

5. бактериальный

**42. Наиболее опасный путь поступления в организм токсичных веществ в производственных условиях:**

1. пероральный

2. ингаляционный

3. перкутанный

**43. Смена халатов у провизоров и фармацевтов должна производиться:**

1. ежедневно

2. 2 раза в неделю

3. 1 раз в неделю

**44. Индивидуальные полотенца фармацевтов должны заменяться:**

1. ежедневно

2. 2 раза в неделю

3. 1 раз в неделю

**45. При лицензировании учреждений, в том числе аптек, проверяют ли их соответствие требованиям технике безопасности:**

1. проверяют

2. не проверяют

3. по усмотрению организации, выдающей лицензию

4. по распоряжению вышестоящего начальника

**46. Основное преимущество люминесцентных ламп:**

1. экономичность

2. взрыво - пожаробезопасность

3. спектральный состав излучения близок к дневному свету

4. отсутствие резких теней

**47. Санитарный день в аптеке производится:**

1. два раза в месяц

2. один раз в месяц

3. один раз в квартал

**48. Разрешается ли персоналу мыть руки над раковиной для мытья аптечной посуды:**

1. разрешается персоналу связанному с мытьем аптечной посуды

2. не разрешается никому

3. разрешается когда аптечная посуда не моется

4. разрешается персоналу аптеки в любое время

Дополнить:

**49. По количеству заболеваний среди специалистов аптек первое место занимает .....**

**50. Специалисты аптек должны проходить медицинские осмотры в лечебно-профилактических учреждениях ..... раз (раза) в год. В центре профпатологии ..... раз (раза) в год (года).**

Ответы к тестам Фармация.

1. 2

2. 1

3. 1

4. 2, 4, 5, 6

5. 2

6. 2, 3

7. 2

8. 1
9. 3
10. 2
11. 1 - перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров  
2 - список № 1 сильнодействующих веществ  
3 - список № 2 ядовитых веществ  
4 - этиловый спирт  
5 - апоморфина гидрохлорид, дикаин, атропина сульфат, гоматропина гидробромид, лития оксибутират, пахикарпина гидрохлорид
12. 1. Всероссийский сертификат соответствия  
2. Региональный протокол соответствия
13. 1. в защищенном от света месте  
2. при температуре от 0 °С до 15 °С
14. 1 - 2, 1, 4 2 - 3, 5, 6
15. 1 - 1, 2, 4 2 - 3, 5, 6
16. 1 - 5, 4, 6, 3 2 - 1, 2, 7
17. 1 - 1, 2 2 - 3, 4, 5, 6
18. 1 - 3 2 - 1 3 - 6
19. 1 - 1 2 - 2 3 - 3
20. 1 - 3 2 - 1 3 - 5
21. в
22. а
23. б
24. в
25. в
26. а, б, г, д
27. б, г, е
28. а, б, е
29. б, в
30. б, в, г, е
31. а, б, д, е
32. б, в
33. д, е
34. б, в, д
35. а, в, г, е
36. в
37. г
38. б
39. г
40. а
41. 2, 4
42. 2
43. 2
44. 1
45. 1
46. 3
47. 2
48. 2
49. аллергия
50. один; один; три

