

Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 — «ГамКОВИД-Вак»

Показания к вакцинации

Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у взрослых старше 18-ти лет.

Временные противопоказания к вакцинации

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
- обострение хронических заболеваний.

Вакцинацию проводят через 2 – 4 недели после выздоровления от острой инфекции или начала ремиссии. При нетяжёлых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ — допускается проведение вакцинации после нормализации температуры.

Ситуации, не включённые в инструкцию к вакцине, которые необходимо учитывать, как временные противопоказания:

- контакт с больным COVID-19 или с подозрением на это заболевание менее, чем за 14 дней до прививки (вакцинацию проводят после 14-ти дней от момента контакта);
- предшествующая плановая вакцинация (против гриппа, пневмококковой инфекции и т. д.), прививка от коронавирусной инфекции проводится через 1 мес.;
- при перенесении острой инфекции между 1-м и 2-м введением вакцины, второй компонент следует ввести с соблюдением интервала в 21 день или, как можно быстрее, после выздоровления от острой инфекции.

Постоянные противопоказания к вакцинации

- гиперчувствительность (анафилактические реакции в анамнезе) к компонентам вакцины или вакцин, содержащих аналогичные компоненты;
- тяжёлые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжёлые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40°C и т. д.) на введение компонента I вакцины.

Противопоказания на настоящий момент (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)

- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18-ти лет.

Вакцинация людей с иммунодефицитными заболеваниями, и заболеваниями при которых проводится иммуносупрессивная терапия (онкологические, аутоиммунные)

Безопасность и эффективность вакцины у этих групп людей не изучалась, в связи с чем, вопрос о вакцинации (польза/риск) должен решаться комиссионно.

Общие сведения о вакцинации для привитых.

Вакцина на основе не размножающегося вектора аденовируса, при введении в организм привитого у 7-10% привитых возможно развитие общих и местных реакций в 1-2-е дни после прививки полностью проходящих к 3-му дню.

Общие реакции: гриппоподобный синдром (повышение температуры, головная боль, миалгии, сонливость), в единичных случаях отмечались тошнота, нарушение стула, снижение остроты зрения, ощущения запахов. Появляющиеся симптомы не требуют терапии, при температуре выше 38,0°C — назначение НПВС.

Местные реакции: боль в месте введения вакцины, гиперемия, отёк, уплотнение. При выраженном болевом синдроме можно принять НПВС (парацетамол), местно — мази (троксевазин, фенистил-гель).

Перед прививкой проводится осмотр, термометрия, уточнение анамнеза, в том числе, эпид. анамнеза (наличие острых больных в окружении). При вакцинации пациентов с хроническими заболеваниями оценить состояние ремиссии. После вакцинации привитой должен находиться под наблюдением медиков не менее 20-30 минут.

При вакцинации людей с хронической патологией проведение патронажа по телефону на 1-й и 3-й дни после прививки.