

Осложнения ОРВИ в ЛОР-практике

Милованов М. А.
Врач оториноларинголог
асс. кафедры глазных и ЛОР-болезней


Острый ринит

Воспаление слизистой оболочки полости носа, при котором в течение 24 часов наблюдаются 2 и более из перечисленных симптомов:


- Заложенность носа
- Выделения из носа
- Чихание
- Жжение в полости носа
- Слезотечение
- Понижение обонятельной чувствительности

Стадии острого ринита

1. «Сухая» стадия
2. Стадия серозных выделений
3. Стадия серозно-гнойных выделений (разрешение инфекционного процесса)



Строение полости носа



Околоносовые пазухи




Острый поствирусный риносинусит

- **Ухудшение общего самочувствия на 5-7 день от начала заболевания**
- **Затруднение дыхания через нос**
- **Выделения из носа**
- **Головные боли, усиливающиеся к вечеру**

Болезни среднего уха


Infant

Adult




Eustachian tube

Средний отит




1



3

- Заложенность уха
- Ощущение переливания жидкости в ухе
- Шум в ухе при глотании
- Эхо собственного голоса
- БОЛЬ!!!

**40% средних отитов
заканчиваются
самопроизвольно,
однако...**



4



5

Другие причины боли в области уха

- ❖ Воспаление тройничного, языкоглоточного, лицевого, затылочного нервов
- ❖ «Отраженные» боли при шейном остеохондрозе
- ❖ Артрит височно-нижнечелюстного сустава
- ❖ Воспаление слюнных желез

Чем я могу себе помочь

- Использовать сосудосуживающие капли в остром периоде заболевания
- Не капать в уши что попало под руку (борный спирт, камфору, луковый сок, лекарственные препараты без назначения врача, герань)
- Сморгаться только через одну половину носа
- Жевательная резинка поможет выровнять давление в среднем ухе
- Не использовать объемные баллоны для промывания носа
- Избегать попадания воды в ухо

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

